

# Depresión en cuidadores primarios informales de pacientes con limitación en la actividad

*Depression in primary informal caregivers of patients with activity limitations*

*Depressão em cuidadores informais de pacientes com limitação atividade primária*

**Beatriz Konimí Buenfil Díaz**

Universidad Autónoma de Yucatán, México

[koni.buenfil@hotmail.com](mailto:koni.buenfil@hotmail.com)

**Nayeli Alejandra Hijuelos García**

Universidad Autónoma de Yucatán, México

[ahijuelos@correo.uady.mx](mailto:ahijuelos@correo.uady.mx)

**Juan Carlos Pineda**

Universidad Autónoma de Yucatán, México

[pcortes@correo.uady.mx](mailto:pcortes@correo.uady.mx)

**Humberto Salgado Burgos**

Universidad Autónoma de Yucatán, México

[humberto.salgado@correo.uady.mx](mailto:humberto.salgado@correo.uady.mx)

**Elsy Arlene Pérez Padilla**

Universidad Autónoma de Yucatán, México

[ppadilla@correo.uady.mx](mailto:ppadilla@correo.uady.mx)

Número 10. Julio - Diciembre 2016

## Resumen

La discapacidad producida por enfermedades neuromusculares afecta las funciones corporales, psicológicas y sociales de los pacientes. Por lo tanto, sus cuidados son complicados y requieren de un cuidador primario informal que les brinde apoyo físico y emocional. Esto hace que la calidad de vida del cuidador tienda a deteriorarse y a que surjan situaciones contraproducentes.

El objetivo principal de esta investigación fue determinar la relación existente entre el nivel de limitación en la actividad que presentan los pacientes con enfermedades neuromusculoesqueléticas y los índices de depresión en sus cuidadores primarios familiares, quienes acudieron a la Unidad Universitaria de Rehabilitación de la Universidad Autónoma de Yucatán de enero a mayo de 2016.

A los cuidadores primarios informales se les tomaron variables sociodemográficas y se les aplicaron los siguientes instrumentos: Cuestionario Sociodemográfico para Cuidadores Primarios Familiares Informales, Índice de Depresión de Beck, y Lista de Cotejo de la Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud.

Los resultados muestran un perfil caracterizado por cuidadores primarios, en su mayoría mujeres (83.3 %), con una edad media de  $46.6 \pm 13.4$  años, amas de casa, casadas y con una escolaridad de nivel licenciatura (50 %). Se encontró una correlación positiva y significativa ( $r=0.63$ ,  $p=0.00488$ , coeficiente de correlación de Pearson) entre el nivel de depresión de los cuidadores primarios y el nivel de la limitación en la actividad de los pacientes a su cargo.

Los cuidadores primarios familiares de los pacientes con enfermedad neuromusculoesquelética y que acuden a la Unidad Universitaria de Rehabilitación de la Universidad Autónoma de Yucatán, son en su mayoría mujeres, amas de casa y con escolaridad de licenciatura. Los resultados indican que a mayor limitación en la actividad de los pacientes con enfermedad neuromusculoesquelética, mayor es el índice de depresión de su cuidador primario informal.

**Palabras clave:** depresión, limitación en la actividad, cuidadores primarios informales.

## Abstract

The disability produced by disease neuromuscular affects the body, psychological and social functions of the patients. Therefore, their care are complicated and require an informal primary caregiver to provide them physical and emotional support. This makes the quality of life of the caregiver shop to deteriorate and to counterproductive situations from arising.

The main objective of this research was to determine the relationship between the level of limitation on activity presenting patients with neuromusculoskeletal diseases and the rates of depression in their primary family caregivers, those who attended the University Rehabilitation Unit of the Autonomous University of Yucatán from January to May 2016.

Informal primary caregivers socio-demographic variables were taken to them, and the following instruments were applied to them: socio-demographic for primary informal family caregivers questionnaire, Beck Depression Inventory, and Comparison List of the «International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF)».

The results show a profile characterized by primary caregivers, mostly women (83.3%), with an average age of  $46.6 \pm 13.4$  years, housewives, married and with a schooling level Bachelor's degree (50%). They found a positive and significant correlation ( $r=0.63$ ,  $p=0.00488$ , Pearson correlation coefficient, PCC) between the level of depression of the primary caregivers and the level of the activity limitation of patients they take care of.

Primary family caregivers of patients with neuromusculoskeletal disease and that attend the University Rehabilitation Unit of the Autonomous University of Yucatán, they are mostly women, housewives that hold a Bachelor's degree. The results indicate that the greater limitation on the activity of the patients with neuromusculoskeletal disease, the greater is the index of its primary informal caregiver depression.

**Key words:** depression, activity limitations, informal primary caregivers.

## Resumo

A deficiência causada por doenças neuromusculares que afetam corporais, funções psicológicas e sociais dos pacientes. Portanto, seus cuidados são complicadas e exigem um cuidador primário informal que lhes dá apoio físico e emocional. Isso faz com que a qualidade de vida do cuidador tende a deteriorar-se e para contrariar surgir situações.

O principal objetivo desta pesquisa foi determinar a relação entre o nível de limitação de atividade experimentado por pacientes com doenças músculo-esqueléticos e as taxas de depressão em seus cuidadores primários familiares, que participaram Unidade de Reabilitação da Universidade da Universidade Autónoma de Yucatan janeiro-maio de 2016.

A cuidadores informais primários foram tomadas sociodemográfico e foram aplicados os seguintes instrumentos: Questionário sociodemográfico primária Família Cuidador Informal, Beck Índice de Depressão e Checklist da Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde.

Os resultados mostram um perfil caracterizado por cuidadores primários, a maioria mulheres (83,3%) com idade média de  $46,6 \pm 13,4$  anos, donas de casa, casados e um nível médio completo (50%). uma correlação positiva e significativa ( $r = 0,63$ ,  $p = 0,00488$ , Pearson coeficiente de correlação) entre o nível de depressão em cuidadores primários e o nível de limitação de atividade em pacientes considerados responsáveis.

Os familiares cuidadores primários de pacientes com doença neuromusculoskeletal e freqüentando Unidade de Reabilitação da Universidade da Universidade Autónoma de Yucatán, são na sua maioria mulheres, donas de casa e grau de escolaridade. Os resultados indicam que a limitação actividade mais elevada em pacientes com doença esquelético, quanto maior a taxa de quebra de cuidador primário informal.

**Palavras-chave:** depressão, limitação de atividade, cuidadores primários informais.